

Patologie	Nome	% THC	% CBD	Profilo terpenico dominante	Età
Effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali	Bedrocan	22	<1	Sativa	Adulti (soprattutto con forti dolori)
	Pedanhos 22:1	22	1	Sativa	
	FM1	13-19	<1	Sativa	
	Bedica	14	<1	Indica	Adulti e anziani con difficoltà a dormire
	Pedanhos 8:8	8	8	Sativa	Adolescenti e anziani
	Bedrobinol	12	<1	Sativa	
Analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace	Bediol	6,5	8	Sativa	Adulti, adolescenti, anziani
	FM2	5 - 8	7,5 - 12	Sativa	Adolescenti e anziani
	Bedrobinol	12	<1	Sativa	Adulti
Analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistenti alla terapia tradizionale	Bedrobinol	12	<1	Sativa	Adulti che fanno già uso di Cannabis
	FM1	13 - 19	<1	Sativa	
	Bedica	14	<1	Indica	
	Pedanhos 22:1	22	<1	Sativa	
	Bedrocan	22	<1	Sativa	
	Bediol	6,5	8	Sativa	Adulti naïve per la Cannabis
	FM2	5 - 8	7,5 - 12	Sativa	
	Pedanhos 8:8	8	8	Sativa	
	Bediol	6,5	8	Sativa	Adolescenti e anziani
	FM2	5 - 8	7,5 - 12	Sativa	
Effetto stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard	Bedrobinol	12	<1	Sativa	Tutti i pazienti
	Bedica	14	<1	Indica	Giorno
	FM1	13 - 19	<1	Sativa	Sera
Effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali	Bedrocan	22	<1	Sativa	Tutti i pazienti
	Pedanhos 22:1	22	<1	Sativa	
	Bediol	6,5	8	Sativa	
Riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard	Bediol	6,5	8	Sativa	Tutti i pazienti
	FM2	5 - 8	7,5 - 12	Sativa	
	Pedanhos 8:8	8	8	Sativa	